

Description:

d'après le Dr. Jacques Pellegrin

(Muséum d'Histoire Naturelle de Paris)

Sous *Lamprologus stappersii*

La hauteur du corps est comprise 3 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur, sans la caudale, la longueur de la tête presque trois fois. La tête est 1 fois $\frac{3}{4}$ aussi longue que large. Le museau est un peu plus court que l'œil qui est contenu 2 fois $\frac{3}{4}$ dans la longueur de la tête. L'espace interorbitaire est compris 1 fois $\frac{1}{2}$ dans le grand diamètre de l'œil. Le profil supérieur est droit. La bouche s'étend jusqu'au dessous du bord antérieur de l'œil. La mâchoire inférieure est légèrement proéminente. Il y a 6 canines crochues, à pointe tournée en arrière, à chaque mâchoire, les externes beaucoup plus développées, suivies d'une bande moyenne de petites dents. Les dents des côtés sont petites. On compte 6 rangées d'écailles sur les joues. Les écailles sont moyennes sur l'opercule. Les branchiospines moyennes, pointues, au nombre de 6 en bas du 1^{er} arc branchial, 3 en haut. Les écailles sont fortement ciliées, celle de la nuque et de la partie avant des ventrales plus petites. On en compte 31 en ligne longitudinale $3\frac{1}{2}$ sur 9 en ligne transversale. La ligne latérale supérieure s'étend sur 19, l'inférieure sur 6 écailles. La dorsale est composée de 17 épines croissantes, la dernière comprise 2 fois $\frac{1}{2}$ dans la longueur, et de 8 rayons mous médiocrement prolongés. L'anale est formée de 9 épines, la dernière égalant environ la dernière de la dorsale et de 6 rayons mous. La pectorale, arrondie, fait près des $\frac{2}{3}$ de la longueur de la tête. La ventrale, dont le 2^e rayon mous est plus long, arrive au niveau de la 4^e épine anale. Le pédicule caudal est à peine plus long que haut. La caudale, arrondie, fait les $\frac{2}{3}$ de la longueur de la tête.

La teinte est brunâtre en dessus avec des traces de fasciatures, jaunâtres en dessous. La tache noire operculaire est très nettement marquée. La dorsale est grisâtre avec quelques taches claires, surtout sur la partie molle ; chaque pinnule des rayons épineux est marquée de noir. Les ventrales sont grisâtres, les autres nageoires jaunâtres.

D. XVII 8 ; A. IX 6 ; P. 13 ; V. I 5 ; Sq $3\frac{1}{2}$ | 31 | 9.

Un spécimen de la rivière Sambala dans la plaine St-Louis : (environ de Mpala-Tanganyika). Dr. Stappers.

Longueur totale : $43 + 8 = 51$ millimètres.

Ce petit *Lamprologus* avait été vu et indiqué comme nouveau, mais non décrit, M. G. A. Boulenger. Je dédie volontiers au regretté voyageur le Dr. Stappers, qui l'a récolté en 1913 et est mort victime de la guerre en 1916.

Ce poisson se rapproche du *Lamprologus lemairei* Boulenger, du lac Tanganyika, mais dans cette espèce les écailles sont plus nombreuses, en ligne longitudinale et en ligne transversale et, en outre, la joue est nue.




Fig. 84. — *Lamprologus stappersii* PELLEGRIN, type, long., 51 mm., riv. Sambala, environs de Mpela, 1913, L. STAPPEES (X 2).



Fig. 85. — *Lamprologus stappersii*, PELLEGRIN, type, même ex., os pharyngien inférieur, (X7 1/2).

